



ЕС МІЛЕДІ

ФАО 330

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ Зерно

ТИП ЗЕРНА Кременисто-зубовидний

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Зони вирощування Степ, Лісостеп



Рекомендований для оптимальних (від +10 °С) термінів сівби

Необхідно звертати увагу на фазу розвитку при внесенні гербіцидів групи 2,4-Д

УРОЖАЙНІСТЬ



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай за посушливих умов
- Рентабельний гібрид із високим потенціалом продуктивності вирощування
- Швидкий розвиток на початкових етапах росту забезпечує дружні сходи та дозволяє оптимізувати застосування гербіцидів

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Зона достатнього зволоження, тис./га 65-70

Зона недостатнього зволоження, тис./га 50-60

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Низька	Висока
Енергія початкового росту		9
Вологовіддача		8
Посухостійкість		8
Стійкість до вилягання		9
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ		
- Фузаріозу качана		8
- Фузаріозу стебла		8
- Гельмінтоспоріозу		9
- Пухирчастої сажки		9
- Летючої сажки		8
Рівень адаптації до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах		7