



**АСТРЕЛ[®]
МАКС**

**Жодних бур'янів –
жодних конкурентів!**

Селективний гербіцид для контролю
бур'янів від посіву до збору врожаю!



Астрел Макс – вдосконалена версія відомого гербіциду Астрел Плюс, який завоював довіру тисяч аграріїв в усіх регіонах України. Для покращення формуляції препарату вчені витратили декілька років, щоб захист посівів кукурудзи та соняшнику став ще більш ефективним та безпечним. **Оновлений гербіцид вже відкрив полювання на ваші бур'яни!**

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ

Призначення: селективний гербіцид з пролонгованою дією для контролю широкого спектру бур'янів в посівах кукурудзи та соняшнику

Діючі речовини: ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + антидот АД-67, 45 г/л

Препаративна форма: суспензія

Спосіб дії: ґрунтовий та страховий

Упаковка: канистра 20 л

СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР'ЯНІВ

Астрел Макс контролює понад 100 видів бур'янів!

Українська назва	Латинська назва	Чутливість
Амброзія полинолиста	Ambrosia artemisiifolia	+++
Галінсога (види)	Galinsoga spp.	+++
Гірчак березковидний	Polygonum convolvulus	+++
Гірчак шорсткий	Polygonum lapathifolium	+++
Гірчиця польова	Sinapis arvensis	+++
Грицики звичайні	Capsella bursapastoris	+++
Дурман звичайний	Datura stramonium	+++
Канатник Теофраста	Abutilon theophrasti	+++
Лобода біла	Chenopodium album	+++
Мишій (види)	Setaria spp.	+++
Нетреба (види), післясходово	Xanthium spp.	++
Падалиця ріпаку	Brassica napus	++
Падалиця соняшнику, післясходово	Helianthus annuus	+++
Паслін чорний	Solanum nigrum	+++
Портулак городній	Portulaca oleracea	+++
Просо куряче (Плоскуха)	Echinochloa crusgalli	+++
Редька дика	Raphanus raphanistrum	++
Ромашка (види)	Matricaria spp.	+++
Талабан польовий	Thlaspi arvense	+++
Щириця звичайна	Amaranthus retroflexus L.	+++

● КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ

Культура	Бур'яни	Норма внесення	Спосіб та час обробки	Кратність обробок
Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,5	Обприскування ґрунту перед посівом, під час посіву, після посіву включно до 4 справжніх листків культури, але не більше 2 справжніх листків у бур'янів	1
Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,8*-3,5	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до сходів культури	1

* Очікується реєстрація (для малогумусних ґрунтів)

● ПОЛЬОВИЙ ДОСВІД ФАХІВЦІВ

● Ференц Василь Євгенович


головний агроном, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, СГТОВ «Лище»

В 2012 році, коли на ринку з'явився гербіцид Астрел Плюс, ми придбали невелику кількість препарату на випробування. Побачивши відмінний результат його дії, ввели його в систему захисту кукурудзи і використовували 8 років поспіль.

Маємо досвід внесення Астрел Плюс і досходою, і післясходою – по 3-му та навіть по 5-му листу – в нормі 3,5 л/га. Основними бур'янами у нас є щиріця, лобода, куряче просо та інші однорічні дводольні та злакові бур'яни. З усіма ними Астрел справляється ідеально, навіть значно пригнічував злісний осот. Як кажуть, маємо чорне поле до збору врожаю. Врожайність отримували стабільно 12,5-13 т/га.

Пригадую випадок, коли під час Дня поля фермери випадково потрапили на наше поле кукурудзи та, помітивши його відмінний стан, питали, чим ми обробляєм кукурудзу. Я з задоволенням розповів, що ми вносимо Астрел Плюс. Після того майже всі сусіди-фермери також використовували цей препарат і дякували за пораду.

Я радий поверненню на ринок цього продукту, ще й з поліпшеною формуляцією. Вже замовили на наступний сезон Астрел Макс, тому що впевнені в його дії.



● Середа Володимир Віталійович

головний агроном, Волинська обл., Луцький р-н, с. Романів, СГТОВ «Романів»

З препаратом Астрел Плюс працювали 2 роки, використовуючи на 300 га посівів кукурудзи. Обробку проводили по 3-му листку культури, боролися з однорічними злаковими бур'янами, лободою, щиріцею, пасльоном та ін. Впевнено кажу – контролює бур'яни ідеально.

Цікаво, що навіть після культивування під час підживлення мінеральними добривами дія гербіциду не знизилась. Це дуже порадувало нас, адже хвилювалися, що порушимо гербіцидний екран та, можливо, з'являться бур'яни. Але потужності Астрелу вистачило до самого збору врожаю. Мене влаштовує саме такий варіант – обробив один раз і не хвилюєшся.

Ще однією перевагою препарату вважаю те, що навіть після сильних дощів немає пригнічення кукурудзи чи втрати ефективності. Ми бачили це на власні очі, коли за 7 днів після обробки Астрел Плюс пішли затяжні дощі декілька днів поспіль. Але препарат спрацював чудово, поле було чисте до самих жнив.

Врожайність отримували 13,5 т, ми задоволені. Чекали на повернення препарату на ринок та вже замовили собі на 500 га Астрел Макс.



● Юрій Володимирович Зайда

головний агроном, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Зелені Кошари, ДП «ДГ «ЗЕЛЕНІ КОШАРИ»

Ми неодноразово використовували Астрел Плюс в схемі захисту соняшнику. Декілька років поспіль обробляли ним близько 500 га досходою, в нормі 3,5 л/га. Хочемо відмітити, по-перше, потужну гербіцидну дію Астрелу. Боролися зі свиріпою, мишієм, щиріцею, лободою та злаковими бур'янами. Завдяки Астрелу нам вистачає однієї досходової обробки, щоб тішитися чистим полем до врожаю. По-друге, ми вже на власному досвіді переконалися, що в нашій зоні препарат не має ані фітотоксичної дії на соняшник, ані післядії в наступні сезони. Це точно гарний та якісний препарат, який може порадити іншим аграріям.





МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ

- ⊕ Оновлений безпечний антидот мінімізує ризики фітотоксичного впливу ацетохлору на рослини кукурудзи як за ґрунтового, так і за страхового застосування
- ⊕ Стабільний результат на різних типах ґрунтів та за різних умов зволоження
- ⊕ Може застосовуватися на полях із класичним та мінімальним обробітком ґрунту
- ⊕ Дуже широке вікно застосування: понад 30 днів (від посіву до 4 листків незалежно від фази розвитку кукурудзи!)
- ⊕ «Спаляюча» дія на падалицю класичного та імі/трибенурон-метил стійкого соняшнику
- ⊕ За вегетаційний період повністю розкладається в ґрунті, на наступний сезон немає ніяких обмежень в сівозміні




Лобода біла
(*Chenopodium album*)



Амброзія полинолиста
(*Ambrosia artemisiifolia*)



Падалиця соняшнику
(*Helianthus annuus*)
післясходово



Плоскуха звичайна
(*Echinochloa crus-galli*)



Щириця
(*Amaranthus retroflexus*),
в т.ч стійка
до ALS-інгібіторів

● ПОТУЖНА КОНТАКТНА ДІЯ НА ШИРОКИЙ СПЕКТР БУР'ЯНІВ



● Поле без застосування гербіциду



● Поле після застосування
Астрел Плюс – 3,5 л/га

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НА КУКУРУДЗІ

АСТРЕЛ МАКС має у 2,5 рази ширше вікно застосування, ніж звичайні страхові гербіциди!



3,5 л/га

25-35 діб

ВВСН 00

09

12

13

14

15

19


31

51

61

71

79





МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

- ⊕ Еталонний рівень контролю лободи, амброзії та гірчаків
- ⊕ Посилена ефективність проти злакових бур'янів
- ⊕ Висока ефективність навіть за складних погодних умов
- ⊕ Тривала ґрунтова дія (до 9 тижнів) завдяки ефекту реактивації
- ⊕ Стимування появи нових «хвиль» бур'янів, що забезпечує чисте поле до збору врожаю
- ⊕ Відсутні обмеження в сівозміні



Лобода біла
(*Chenopodium album*)



Амброзія полинолиста
(*Ambrosia artemisiaefolia*)



Мишій види
(*Setaria spp.*)




Плоскуха звичайна
(*Echinochloa crus-galli*)



Щириця
(*Amaranthus retroflexus*),
в т.ч стійка
до ALS-інгібіторів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ



- ⊗ Препарат застосовується в посівах соняшнику не пізніше ніж на третій день після посіву
- ⊗ Препарат не потребує негайної заробки в ґрунт
- ⊗ При застосуванні на легких малогумусних ґрунтах норму застосування препарату слід зменшити до 2,8 л/га
- ⊗ Ґрунт має бути якісно підготовлений
- ⊗ Наявність в достатній кількості ґрунтової вологи є передумовою отримання максимальної ефективності препарату

● РЕКОМЕНДОВАНА БАКОВА СУМІШ

Для розкриття максимального потенціалу дії препарату в посівах соняшнику рекомендуємо застосовувати бакову суміш:

АСТРЕЛ[®] МАКС + **РОУБЕК[®]**
2,8*-3,5 л/га 0,2-0,4 л/га

- ⊗ Зменшення ризику фітотоксичності у вологих умовах
- ⊗ Подовження періоду ефективної дії гербіциду
- ⊗ Підсилення дії гербіциду на середньочутливі бур'яни
- ⊗ Вища ефективність за посушливих умов
- ⊗ Рівномірне якісне внесення

* Очікується реєстрація (для малогумусних ґрунтів)

Жодних бур'янів –
жодних конкурентів!



**АСТРЕЛ[®]
МАКС**



SUMI AGRO

ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН»

м. Київ, вул. Антоновича,
172-а (10 поверх)
(044) 494-37-04
info@summit-agro.com.ua
www.summit-agro.com.ua



З питань закупівлі
звертайтеся до офіційних
дистриб'юторів



Завантажуйте наш
мобільний додаток
на смартфон

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.